

# ヒカリミネラル

7種類のミネラル (Mg, Mn, B, Fe, Cu, Zn, Mo) feat. アミノ酸パワー！

ミネラル補給で光合成活性化！！

低分子アミノ酸補給で  
花芽分化、果実肥大、糖度アップ！！！！



荷姿：5kg×4袋/ケース

| 保証成分 (%) |       |         |        | 含有成分例 (%) |      |       |          |
|----------|-------|---------|--------|-----------|------|-------|----------|
| アミノ酸態窒素  | 水溶性苦土 | 水溶性マンガン | 水溶性ほう素 | 水溶性鉄      | 水溶性銅 | 水溶性亜鉛 | 水溶性モリブデン |
| 2.0      | 12.0  | 5.5     | 0.75   | 0.42      | 0.03 | 0.07  | 0.033    |



昭光通商アグリ株式会社



# ヒカリミネラル

## ヒカリミネラルとは

- ①高純度低分子アミノ酸（**グリシン**）を補給します。  
→成り疲れ防止、ストレス対抗、品質向上、食味向上等
- ②**7種類**の**ミネラル**が作物の生育を調整します。  
→発根促進、徒長防止、受勢回復、生理障害回避等
- ③アミノ酸、苦土、マンガンが葉緑素を生成し**光合成を促進**します。

## ヒカリミネラルの使用方法

基本使用方法：

「**10aに対し本剤5kgを灌水**」又は  
「**500倍～1000倍希釈液を葉面散布**。」

| 作物別使用方法 |                                                                          |                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 対象作物    | 灌水・灌注（10a当）                                                              | 葉面散布                                            |
| 水稻      | 育苗の追肥（発根促進・徒長防止） 1000倍溶液                                                 |                                                 |
| 果菜類     | 定植期（活着促進、花芽充実） 2～5kg溶液<br>生育期（光合成促進、徒長防止） 2～5kg溶液<br>収穫期（成り疲れ防止） 2～5kg溶液 | 500～1000倍散布<br>発根促進、徒長防止、光合成促進                  |
| 葉菜類     |                                                                          | 育苗期（健苗育成、徒長防止） 1000倍散布<br>定植期（発根促進、結球促進） 500倍散布 |
| 果樹類     | 萌芽期～開花期 500倍灌注 花揃えと徒長防止<br>収穫後 300～500倍液灌注 貯蔵養分の増加                       | 開花期～果実肥大期<br>500倍散布 着果促進 着色促進 花芽充<br>実          |

## ヒカリミネラル使用上の注意

希釈後は直ちにご使用ください。  
銅剤農薬・石灰硫黄合剤との混用は控えてください。  
水和時は**少しずつ混ぜながら**ご利用ください。

製造・販売元



昭光通商アグリ株式会社